



品名	劑型	成份	適應症	用法用量	副作用
Adalat Oros 30MG 冠達悅歐樂錠 30 公絲 衛署藥輸字第 022951 號 BA22951100		Nifedipine	高血壓。	一天 1 次，一次 1-2 粒，飯前。	心跳不規則.皮膚紅疹.下肢水腫.頭暈.頭痛.噁心。
ADRENALIN INJECTION 安得理那寧注射液 衛署藥製字第 000480 號 A000480209		Epinephrine	過敏反應引起之休克，呼吸道痙攣或喉頭水腫，心跳停止之急救，支氣管性氣喘。	肌肉或皮下注射，起始劑量 (0.2~0.5mg)，視需要每 10~15 分鐘重覆給藥。必要時每一劑量可增加到 1mg 的最高劑量。	頭痛.心跳加速.噁心。
AKINFREE TABLETS 2MG 安汀復錠 2 毫克 衛署藥製字第 047044 號 AC47044100		Biperiden Hcl	帕金森氏症。	巴金森氏症：口服 2mg，一天 3~4 次，每日最高劑量 16mg。	視力模糊.便秘.流汗減少.排尿疼痛.昏昏欲睡.畏光.噁心。
ALINAMIN-F 50 S.C. TABLETS 合利他命—F 50 糖衣錠 衛署藥製字第 004085 號 N004085100		Thiamine Tetrahydrofurfuryl Disulfide,Riboflavin (Vit B2)	腳氣.神經炎.維生素 B1 缺乏症.神經痛.術後腸管麻痺.眼睛疲勞.神經性膀胱炎。	成人每日服用本藥 5-150mg。本藥很適合採用大量療法，當實施大量療法時，每日服用量提高為 300mg。	皮膚紅疹.腹痛。

<p>ALPRALINE TABLETS 0.5MG "S.T." "信東" 安柏寧錠 0.5 公絲 衛署藥製字第 044685 號 A0446851G0</p>		<p>Alprazolam</p>	<p>焦慮狀態。</p>	<p>焦慮：0.25~0.5mg，一天三次。</p>	<p>腳步笨拙或不穩.頭暈.昏昏欲睡.口齒不清.食慾改變。</p>
<p>Amillian Tablets 200 mg 意兒樂錠 200 毫克 衛署藥製字第 049097 號 AA49097100</p>		<p>Amisulpride</p>	<p>思覺失調症。</p>	<p>Amisulpride 每日劑量低於 400mg，則每日單次給藥即可;如每日劑量高於 400mg 則應分兩次給藥。最高劑量每日不宜超過 1200mg。</p>	<p>失眠.焦慮.激燥不安.錐體外症狀.白天有昏睡感。</p>
<p>AMOPINE TABLETS 5MG "S.T." 脈樂平錠 5 公絲 "信東" 衛署藥製字第 044371 號 A044371100</p>		<p>Amlodipine Besylate</p>	<p>高血壓.心絞痛。</p>	<p>通常起始劑量為 5mg，一天一次。可依病人症狀增加劑量最高至 10mg。</p>	<p>頭痛.疲倦.嗜睡.噁心.腹痛.臉部潮紅.心悸.暈眩。</p>
<p>AMOXICILLIN CAPSULES 250MG "KINGDOM" "景德" 愛默士黴素膠囊 250 公絲 衛署藥製字第 010365 號 A010365100</p>		<p>AMOXICILLIN</p>	<p>呼吸道感染.尿道感染。</p>	<p>成人及體重 20kg 以上兒童通常一次 250mg，每 6 小時服用一次，重症時可增至一次 500mg，每 6 小時服用。</p>	<p>輕微腹瀉.頭痛。</p>

<p>ANXICAM INJECTION 2MG/ML (LORAZEPAM) "SWISS" "瑞士" 安心平注射液 2 公絲/ 公撮 (樂必寧) 衛署藥製字第 039626 號 A039626209</p>		<p>Lorazepam 2mg/ML</p>	<p>焦慮狀態。</p>	<p>IM 時:常用劑量是 0.05mg/kg·最大劑量為 4 mg。在手術前 2 小時給 藥。</p>	<p>嗜眠.頭疼.眩暈.低血 壓.搔癢發疹。</p>
<p>Apa-Cymba 60mg 欣樂 60 公絲 衛署藥製字第 058356 號 AC58356100</p>		<p>Duloxetine</p>	<p>重鬱症。</p>	<p>每日建議劑量為 40-60mg, 分 1-2 次使用。</p>	<p>噁心.口乾.食慾下降.便 秘.疲勞.嗜睡.失眠.流 汗增加。</p>
<p>Apa-Risdol 1mg 鴻汶理思得膜衣錠 1 毫克 衛署藥製字第 047419 號 AB47419100</p>		<p>Risperidone</p>	<p>思覺失調症之相關 症狀, 雙極性疾患之 躁症發作。治療失智 症病人具嚴重攻擊 性, 或精神分裂症類 似症狀。</p>	<p>第 1 天 1mg, 1 天 2 次; 第 2 天 2mg, 1 天 2 次; 第 3 天 3mg, 1 天 2 次;。 維持劑量 2-4mg, 一天 2 次, 最大劑量 8mg, 一天 2 次。</p>	<p>動作遲緩.坐立不安.視 力模糊.月經週期改變. 手發抖。</p>
<p>Apa-Risdol 3mg 鴻汶理思得膜衣錠 3 毫克 衛署藥製字第 047407 號 A047407100</p>		<p>Risperidone</p>	<p>思覺失調症之相關 症狀, 雙極性疾患之 躁症發作。治療失智 症病人具嚴重攻擊 性, 或精神分裂症類 似症狀。</p>	<p>第 1 天 1mg, 1 天 2 次; 第 2 天 2mg, 1 天 2 次; 第 3 天 3mg, 1 天 2 次;。 維持劑量 2-4mg, 一天 2 次, 最大劑量 8mg, 一天 2 次。</p>	<p>動作遲緩.坐立不安.視 力模糊.月經週期改變. 手發抖。</p>

<p>Apo-Quetiapine 100mg 安保思樂膜衣錠 100 公絲 衛署藥輸字第 025653 號 B025653100</p>		<p>Quetiapine</p>	<p>思覺失調症,雙極性 疾患之躁症發作。</p>	<p>成人,精神分裂症:每日劑 量範圍通常在 150-750mg 間。雙極性疾患之躁症發 作:一般有效劑量在每日 400-800mg 的範圍之間。</p>	<p>疲倦想睡,失眠,頭暈,頭 痛,便秘,部分病人會有 姿勢性低血壓,體重增 加,口乾。</p>
<p>APROTAN F.C. TAB. 150MG 壓立安膜衣錠 150 毫克 衛署藥製字第 057178 號 AB57178100</p>		<p>IRBESARTAN</p>	<p>高血壓、治療第 II 型糖尿病腎病變</p>	<p>Initial & maintenance dose: 75-150 mg once daily. May increase to 300 mg once daily</p>	<p>頭痛、頭暈、疲倦、姿 勢性暈眩、噁心嘔吐、 高血鉀、心跳過快、肌 肉骨骼疼痛、肌酸酐增 加</p>
<p>Arizole 10mg 安復立柔錠 10 公絲 衛署藥製字第 055904 號 AC55904100</p>		<p>Aripiprazole</p>	<p>思覺失調症,雙極性 疾患之躁症發作及 混合型發作。</p>	<p>一般常用劑量為每日一 次,每次 10-30 mg。</p>	<p>意外傷害,便秘,靜坐不 能,頭痛,虛弱,四肢水 腫,嘔心,消化不良,嘔 吐,興奮。</p>
<p>ATEOL F.C. TABLETS 50MG 壓平樂膜衣錠 50 毫克 衛署藥製字第 038867 號 AB388671G0</p>		<p>Atenolol</p>	<p>高血壓,狹心症。</p>	<p>成人初始劑量為 50mg , 每日口服一次。 必要時可增加劑量至每 天一次 100mg ,有些狹心 症患者可至每日 200mg 。</p>	<p>呼吸困難,手腳冰冷,心 情鬱卒,心跳變慢,性功 能障礙。</p>

<p>ATIVAN TABLETS 0.5MG 安定文錠 0.5 公絲 衛署藥輸字第 018741 號 B0187411G0</p>		<p>Lorazepam</p>	<p>焦慮失眠。</p>	<p>2~6mg/day in divided doses.</p>	<p>腳步笨拙或不穩.頭暈.昏昏欲睡.口齒不清.食慾改變。</p>
<p>ATROPINE 1MG/ML 硫酸阿托品注射液 衛署藥製字第 004951 號 A004951209</p>		<p>ATROPINE SULFATE</p>	<p>膽石症、幽門痙攣、胃酸過多、胃痙攣、有機磷化物、毛果芸香鹼中毒、診斷用散瞳、調節痙攣、乙醚等麻醉時之抑制支氣管分泌</p>	<p>1.急性心肌梗塞引發的心搏徐緩：起始劑量：靜脈注射 0.4~1mg。需要時每 1-2 小時可逐漸增加至最大劑量 2mg。 2.Anticholinesterase poisoning：SC 或 IM 注射 2~3mg，重複注射至有 Atropine 中毒的癥候時才停止。 3.全身麻醉劑引起的唾液及支氣管分泌：麻醉前 30~60 分使用，SC 或 IM 或 IV 注射 0.4~0.6mg。</p>	<p>口乾、吞嚥困難、支氣管分泌減少、口渴、嘔吐、臉潮紅。</p>
<p>B-GENCIN CREAM 必健乳膏 衛署藥製字第 049877 號 AC49877321</p>		<p>Gentamicin (As Sulfate),Betamethasone Dipropionate</p>	<p>皮膚癬.接觸性皮炎.異位性皮炎.皮膚溢出性皮炎.神經性皮炎.剝落性皮炎.日曬性皮炎。</p>	<p>Cover affected area completely bid。</p>	<p>皮膚浸潤.二度感染.皮膚萎縮.橫紋。</p>

<p>B.H.L. TABLET 5MG 顛立靜錠 5 公絲 衛署藥製字第 046236 號 A046236100</p>		Trihexyphenidyl	帕金森氏症候群。	1 天 1-2mg，分次使用， 逐漸增加劑量。 維持劑量。5-15mg，分次 使用。	便秘.流汗減少.排尿疼 痛.昏昏欲睡.口乾.畏 光.嘔吐。
<p>BEHYD RA TABLETS 泌排特安耶錠 衛署藥製字第 029106 號 A029106100</p>		Benzyhydrochlorot hiazide RESERPINE	高血壓。	成人一天 2 次，一次 1-2 錠，視年齡症狀輕重而酌 量之。	頭暈.胸痛.心跳不規律. 呼吸困難.心跳緩慢.胃 腸不適。
<p>Bethanechol 25mg 酯膽 25 毫克 衛署藥製字第 044254 號 AC44254100</p>		Bethanechol	非阻塞性尿滯留	10-30mg，一日 3-4 次	眩暈、嘔吐、冒汗或潮 紅、流口水
<p>BININ-U TABLETS 5MG "瑞士"易寧優錠 5 公絲 (哈泊 度) 衛署藥製字第 032584 號 A032584100</p>		Haloperidol	躁病、思覺失調症、 噁心、嘔吐、攻擊性 與破壞性之行為障 礙、舞蹈病	成人通常 1 天 2~3 次，1 次 1 錠，依症狀酌量增減	運動不停、靜坐不能、 反射過強、角弓反張、 眼動危象、運動困難、 肢體的不隨意運動、失 眠、不安、頭痛、迷惑、 眩暈及幻覺等


<p>BIPIDEN INJECTION 美必定注射液 衛署藥製字第 044187 號 A044187209</p>		<p>Biperiden</p>	<p>帕金森氏症。</p>	<p>藥物誘發的運動障礙：成人可單劑量肌肉或慢速靜脈注射 2.5-5mg，若有需要 30 分鐘後可再重覆注射相同劑量，一天最大之劑量為 10-20mg。</p>	<p>視力模糊.口乾.便秘。</p>
<p>BISLAN TABLETS 12MG 理冒祛痰錠 12 公絲 衛署藥製字第 026798 號 A026798100</p>		<p>BROMHEXINE HCL</p>	<p>祛痰</p>	<p>Adult 1 tab tid</p>	<p>Nausea, anorexia, abdominal discomfort & pain, headache, allergic reactions</p>
<p>Buporin 150mg 必博寧 150 毫克 衛署藥製字第 054997 號 AB54977100</p>		<p>Bupropion</p>	<p>治療憂鬱症、及治療尼古丁依賴症，作為戒菸之輔助。</p>	<p>起始劑量為 150 mg 每日一次。最高劑量 300mg/日。單次最高劑量 150 mg。二次劑量間至少間隔 8 小時。</p>	<p>失眠、頭痛、口乾、胃腸障礙、噁心、嘔吐、膽醇素上升、黃疸、肝炎</p>
<p>Calm-up 200mg 康緒神膜衣錠 200 公絲 衛署藥製字第 058829 號 AC58829100</p>		<p>Sulpiride</p>	<p>思覺失調症.消化性潰瘍。</p>	<p>(1)初劑量：200-400mg，一天 2 次。最大劑量 1.2gm，一天 2 次。</p>	<p>昏昏欲睡.吞嚥困難.靜坐不能.動作遲緩.手抖.月經週期改變。</p>


<p>CARPINE TABLETS 200MG 卡賓錠 200 公絲 衛署藥製字第 041247 號 A041247100</p>		<p>Carbamazepine</p>	<p>癲癇症.三叉神經痛. 腎原性尿崩症.雙極 性病患。</p>	<p>癲癇大發作.精神運動性 發作: 成人開始劑量 100mg，每日口服一至三 次直獲適當效果，依病人 情況慢慢增加至一天 600mg-1200mg。</p>	<p>視力模糊或複視.眼睛 不靈活。</p>
<p>CLOPINE TABLETS 25MG 克慮平錠 25 毫克 衛署藥製字第 042621 號 A042621100</p>		<p>Clozapine</p>	<p>其他藥物治療失效 的思覺失調症病患。</p>	<p>初始劑量：第一天服用 12.5mg 錠劑一至兩顆;接 著第 2 天可以用一或兩 顆 25mg。若可以承受則 劑量可每天增加 25 至 50mg，於 7-14 天之內達 到每天 300mg 之劑量。之 後，視病情需要，可在 4 天或 1 週後以 50 至 100mg 的每天劑量增加。</p>	<p>昏睡.唾液分泌過多.心 博過速及疲勞。</p>
<p>Clozaril 100mg 可致律錠 100 公絲 衛署藥輸字第 018542 號 B018542100</p>		<p>Clozapine</p>	<p>其他藥物治療失效 的思覺失調症病患。</p>	<p>初始劑量：第一天服用 12.5mg 錠劑一至兩顆;接 著第 2 天可以用一或兩 顆 25mg。若可以承受則 劑量可每天增加 25 至 50mg，於 7-14 天之內達 到每天 300mg 之劑量。之 後，視病情需要，可在 4 天或 1 週後以 50 至 100mg 的每天劑量增加。</p>	<p>昏睡.唾液分泌過多.心 博過速及疲勞。</p>


<p>Coliman 100mg 可樂眠糖衣錠 100 公絲 衛署藥製字第 032112 號 AC32112100</p>		<p>Chlorpromazine Hcl</p>	<p>躁病. 思覺失調症. 噁心.嘔吐.攻擊性與 破壞性之行為障礙。</p>	<p>成人每次 25~100mg，一 天 1~3 次服用。</p>	<p>面無表情.坐立不安.手 發抖.動作遲緩.頭暈.低 血壓。</p>
<p>COLIN SOLUTION 咳利寧液 衛署藥製字第 031011 號 A031011157</p>		<p>Chlorpheniramine Maleate,Platycodon Extract,Polygala Extract,Glycyrrhizin ic Acid</p>	<p>鎮咳.祛痰。</p>	<p>成人用量：每次 5ml，一 天 3~4 次。6~12 歲兒童減 半。</p>	<p>昏昏欲睡。</p>
<p>Dalmadorm Capsule 30mg 當眠多膠囊 30 公絲 衛署藥製字第 036677 號 A036677100</p>		<p>Flurazepam</p>	<p>失眠。</p>	<p>睡前服用 15-60mg。</p>	<p>偶而會發生思睡.眩 暈。</p>
<p>Decan inj. 4mg/2ml 特佳注射液 衛署藥製字第 011477 號 AC11477212</p>		<p>Dexamethasone</p>	<p>關節炎、過敏、氣 喘、休克。</p>	<p>一般 0.5~9mg/dayIM，12 小時一次； 休克：40mgIV</p>	<p>水腫、潰瘍。</p>

<p>DEPAKINE GASTRO-RESISTANT TABLET 200MG 帝拔癲腸溶錠 200 公絲 衛署藥輸字第 014899 號 B014899100</p>		<p>Valproate Sodium</p>	<p>泛發性與局部癲癇症.兒童抽搐或兒童熱性抽搐.行為失常並伴有癲癇症者。</p>	<p>起始劑量 15mg/kg/天，每星期增加 5-10mg/kg，直到癲癇發作控制為止(最大劑量 30mg/kg/天)。</p>	<p>胃腸不適(噁心.嘔吐.食慾不振..等).鎮靜.不安.眩暈.抑鬱.運動失調.肝功能異常.手發抖.掉頭髮...等。</p>
<p>DEPAKINE CHRONO 500MG FILM COATED TABLETS 帝拔癲持續性藥效膜衣錠 500 公絲 衛署藥輸字第 022008 號 B022008100</p>		<p>Valproate Sodium</p>	<p>泛發性與局部癲癇症.兒童抽搐或兒童熱性抽搐.行為失常並伴有癲癇症者。</p>	<p>起始劑量 15mg/kg/天，每星期增加 5-10mg/kg，直到癲癇發作控制為止(最大劑量 30mg/kg/天)。</p>	<p>胃腸不適(噁心.嘔吐.食慾不振..等).鎮靜.不安.眩暈.抑鬱.運動失調.肝功能異常.手發抖.掉頭髮...等。</p>
<p>DEXA ORABASE 0.1% 得舒口內膏 0.1% 衛署藥製字第 042271 號 A042271421</p>		<p>Dexamethasone</p>	<p>糜爛或潰瘍伴隨口內炎及蛇炎。</p>	<p>每天使用數次，以點狀塗抹於患處。</p>	<p>過敏反應發生，請立即停藥。留意納水滯留。尚未確立妊娠中投與的安全性，因此孕婦應避免大量或長期使用本品。</p>

<p>DEXTROSE INJECTION</p> <p>5% "OTSUKA"</p> <p>滴滋樂注射液 5%</p> <p>衛署藥輸字第 011552 號</p> <p>A011552277</p>		<p>Dextrose Monohydrate</p>	<p>手術或其他疾患之水分及營養的補給。</p>	<p>成人：10-25g。病情嚴重時可重複給藥。</p> <p>4. 兒童：a.新生兒每次 250-500mg/kg，直到症狀控制。b.病情嚴重或較大嬰兒：可能需較高劑量，必要時再持續輸注 10%dextrose 以穩定血糖。</p>	<p>可能會刺激腸胃道或引起便秘。</p>
<p>DILANTIN 100MG</p> <p>癲能停膠囊</p> <p>內衛藥製字第 000817 號</p> <p>N000817100</p>		<p>Phenytoin</p>	<p>大發作及局部發作形癲癇，預防及治療神經外科手術所引起之癲癇發作。</p>	<p>口服初劑量：100mg，一天 3-4 次。如有需要，可增加至一天 600mg。維持劑量：一天 200-500mg。</p>	<p>頭痛.疲倦.頭暈.噁心.嗜睡.失眠.過敏性紅疹。</p>
<p>DIPHENHYDRAMINE HCL INJECTION</p> <p>鹽酸二苯胺明注射液</p> <p>衛署藥製字第 022049 號</p> <p>AC22049209</p>		<p>Diphenhydramine Hcl</p>	<p>氣喘.蕁麻疹.皮膚炎.皮膚搔癢症.濕疹.鼻炎。</p>	<p>30-60mg IM or IV daily。</p>	<p>發燒.注射部位不適.注射部位發生類似水痘的疹子。</p>
<p>DOGMATYL F.C. TABLETS 50MG</p> <p>脫蒙治膜衣錠 50 毫克</p> <p>衛署藥製字第 026526 號</p> <p>A026526100</p>		<p>Sulpiride</p>	<p>思覺失調症.消化性潰瘍。</p>	<p>(1)初劑量：200-400mg，一天 2 次。最大劑量 1.2gm，一天 2 次。</p>	<p>昏昏欲睡.吞嚥困難.靜坐不能.動作遲緩.手抖.月經週期改變。</p>

<p>DULCOLAX E.S.C. TABLETS 5MG 樂可舒腸溶糖衣錠 5 毫克 衛署藥製字第 028503 號 A0285031G0</p>		<p>Bisacodyl</p>	<p>暫時緩解便秘.診斷 及手術前清腸。</p>	<p>一般劑量：5-15mg 晚上 服用，隔日早上即可排 便。</p>	<p>腹部不適.腹痛.腹瀉。</p>
<p>DUXETINE CAPSULES 30MG 萬憂停膠囊 30 毫克 衛署藥製字第 056776 號 AA56776100</p>		<p>Duloxetine</p>	<p>重鬱症。</p>	<p>每日建議劑量為 40-60mg，分 1-2 次使用。</p>	<p>噁心.口乾.食慾下降.便 秘.疲勞.嗜睡.失眠.流 汗增加。</p>
<p>EA TEN ORAL SOLUTION 亞典內用液 衛署藥製字第 031036 號 A031036155</p>		<p>Trihexyphenidyl oral sol'n 0.4 mg/ml 100 ml</p>	<p>帕金森氏症。</p>	<p>Initial 1 mg/day on day 1, then increase in 2mg increments at 3-5 day intervals; maintenance, 5-15 mg(divided 3-4 times daily)。</p>	<p>便秘.流汗減少.排尿疼 痛.昏昏欲睡.口乾.畏 光.嘔吐。</p>
<p>ERISPAN-S TABLETS 0.25MG 癒利舒吩錠 0.25 毫克 衛署藥製字第 046729 號 AC46729100</p>		<p>Fludiazepam</p>	<p>焦慮狀態，失眠，肌 肉痙攣。</p>	<p>1 Tab po tid</p>	<p>頭暈.口渴.發疹。</p>



<p>ERYTHROMYCIN Oint</p> <p>0.5%</p> <p>紅黴素眼藥膏 0.5%</p> <p>衛署藥製字第 047370 號</p> <p>AC47370417</p>		<p>Erythromycin Base</p>	<p>治療眼部感受菌引起之急慢性結膜炎. 角膜炎. 淚囊炎. 麥粒腫. 眼瞼緣炎. 角膜潰瘍. 砂眼。</p>	<p>一日一至數次, 或每晚 1 次。視症狀點魚眼患部。本藥須由醫師處方使用。</p>	<p>刺激. 搔癢感。</p>
<p>ESZO TABLETS 2MG</p> <p>艾斯樂錠 2 公絲</p> <p>衛署藥製字第 042646 號</p> <p>A042646100</p>		<p>Estazolam</p>	<p>失眠。</p>	<p>睡前 1-2mg, 嚴重失眠時可增加至 4mg。</p>	<p>腳步笨拙或不穩. 頭暈. 昏昏欲睡. 口齒不清. 心灼熱。</p>
<p>ETUMINE TABLETS 40MG</p> <p>意妥明錠 40 毫克</p> <p>衛署藥製字第 031476 號</p> <p>A031476100</p>		<p>Clothiapine</p>	<p>思覺失調症。</p>	<p>初劑量每日 120-200mg; 維持劑量每日 40-160mg; 分成一至四次投與。</p>	<p>煩躁. 混亂狀態. 錐體外症候群. 肌緊張不足. 視覺模糊。</p>
<p>EUTAC F.C TABLETS</p> <p>150MG</p> <p>憂停膜衣錠 150 公絲</p> <p>衛署藥製字第 042957 號</p> <p>A042957100</p>		<p>Moclobemide</p>	<p>憂鬱症。</p>	<p>本藥於飯後服用, 初始劑量為每日 300mg, 分成 2-3 次服用。視患者對藥物的反應, 可將藥量減少至 1 日 150mg, 或依病人憂鬱程度, 將劑量提高至每日 600mg。</p>	<p>頭痛。</p>


<p>EVY F.C. TABLETS 10MG</p> <p>益美憶 膜衣錠 10 毫克</p> <p>衛署藥製字第 051729 號</p> <p>AC51729100</p>		<p>Memantine</p>	<p>治療中重度及重度之阿茲海默症。</p>	<p>每日最大劑量為 20 毫克，為了降低副作用的風險，前三個星期應以每個禮拜 5 毫克往上增加以達維持劑量。</p>	<p>幻覺.困惑.暈眩.頭痛.疲倦。</p>
<p>Fallep 2mg 服爾眠錠 2 公絲</p> <p>衛署藥製字第 048472 號</p> <p>AC48472100</p>		<p>Flunitrazepam</p>	<p>失眠。</p>	<p>睡前口服 1-2mg。</p>	<p>口乾.便秘.視力模糊.頭暈.嗜睡。</p>
<p>FAXINE TABLETS 37.5MG</p> <p>樂心錠 37.5 公絲</p> <p>衛署藥製字第 047114 號</p> <p>A047114100</p>		<p>Venlafaxine Hydrochloride</p>	<p>Venlafaxine hydrochloride 適用於治療憂鬱症 (depression)，包括鬱症 (melancholia)。</p>	<p>成人建議起始劑量為 75mg/day，分兩次或三次給予，可和食物一起吞服。75mg/day 的增加量應至少以四天的緩衝期調整。最高劑量為 375mg/day。</p>	<p>嘔心.嗜睡，若劑量高於 200mg 可能有血壓上升的可能。</p>
<p>FLUANXOL DEPOT 1ML</p> <p>福祿安持續性注射液</p> <p>衛署藥輸字第 005037 號</p> <p>B005037209</p>		<p>Flupentixol Decanoate</p>	<p>思覺失調症。</p>	<p>深度肌肉注射，初劑量 20mg，再根據病患 5-10 天後的反應，於 2-4 週期間劑量可調整到 20-40mg。</p>	<p>便秘.嗜睡.口乾.暈眩。</p>



<p>Flucan 25mg/ml</p> <p>復康注射液 25 毫克/毫升</p> <p>衛署藥製字第 035671 號</p> <p>A035671209</p>		<p>Fluphenazine Decanoate</p>	<p>精神病狀態.噁心.嘔吐。</p>	<p>對多數病人，開始治療時，可給予 12.5 至 25mg(0.5 至 1ml)的劑量。視病人的情況調整劑量及劑量間隔。</p>	<p>錐體外症狀.黃疸.搔癢.紅斑.周圍性水腫。</p>
<p>Flurazin 5mg</p> <p>富祿靜膜衣錠 5 公絲</p> <p>衛署藥製第 032029 號</p> <p>A032029100</p>		<p>Trifluoperazine</p>	<p>思覺失調症，噁心，嘔吐，攻擊性與破壞性之行為障礙。</p>	<p>成人開始 1 日 2 次，每次服用 1/2-1 錠。最高劑量為 6 錠。</p>	<p>錐體外症狀.血壓下降.不眠.口渴。</p>
<p>FOLIROMIN 50MG</p> <p>服樂明膜衣錠 50 公絲</p> <p>衛署藥輸字第 022097 號</p> <p>B022097100</p>		<p>Sodium Ferrous Citrate</p>	<p>缺鐵性貧血。</p>	<p>100mg-200mg(本劑 2-4 錠)分 1-2 次.飯後服用。又依年齡.症狀適宜增減之。</p>	<p>噁心.上腹部疼痛.嘔吐.頭痛.頭暈.皮膚紅疹。</p>
<p>GENBOU 50MG</p> <p>健復膜衣錠 50 公絲</p> <p>衛署藥製字第 046549 號</p> <p>A046549100</p>		<p>Fluvoxamine Maleate</p>	<p>重度憂鬱症及強迫症。</p>	<p>起始劑量 50mg/day，一日有效劑量在 100-200mg 之間。</p>	<p>嗜眠.便秘.精神激動.厭食和顫抖現象。</p>

<p>GLYCOPYRODYN 1MG</p> <p>格比平錠劑 1 公絲</p> <p>衛署藥製字第 046458 號</p> <p>A046458100</p>		<p>Glycopyrrolate</p>	<p>減少唾液、支氣管、咽囊分泌物和胃分泌之游離酸；麻醉或插管治療時用以阻斷心臟迷走神經反射作用、消化性潰瘍之輔助治療。</p>	<p>初始劑量為每日三次，每次 1-2 錠，持續兩週；維持劑量則為每日早晚各一錠。</p>	<p>口乾、視力障礙、有少數病人可能有排尿困難或便秘現象。</p>
<p>Grumed 2mg</p> <p>達醣定錠 2 公絲</p> <p>衛署藥製字第 046640 號</p> <p>AC46640100</p>		<p>Glimepiride</p>	<p>糖尿病</p>	<p>開始時每天 1mg，1~2 週後可增加至 2~4mg。最大劑量：8mg。每天早餐前服用。</p>	<p>低血糖（冒冷汗、心悸、頭痛、痙攣、昏亂），短暫視力模糊、噁心嘔吐，皮膚疹，黃疸症狀等</p>
<p>HALDOL INJECTION</p> <p>好度注射液</p> <p>衛署藥輸字第 019338 號</p> <p>B019338209</p>		<p>Haloperidol</p>	<p>躁病、思覺失調症、嘔吐、噁心、攻擊性與破壞性之行為障礙、舞蹈病。</p>	<p>（1）急性精神分裂症發作：肌肉注射 5-10mg，每小時持續投與直到症狀受控制。 （2）躁症、肌肉抽搐：5-10mg 靜脈或肌肉注射。 （3）中樞神經性嘔吐：5mg 靜脈或肌肉注射。</p>	<p>坐立不安、動作遲緩、手發抖、表情淡漠、吞嚥困難。</p>


<p>HALDOL DECANOAS 50MG/ML 好度得注射液 衛署藥製字第 019475 號 B019475209</p>		<p>Haloperidol</p>	<p>思覺失調症,躁病,噁心,嘔吐,攻擊性與破壞性之行為障礙,舞蹈病。</p>	<p>深層肌肉注射,成人初劑量為每四星期一次,一次1c.c.,初期最高一次劑量為2c.c.,劑量依症狀酌予增減,每次劑量不宜超過6c.c。</p>	<p>錐體外徑症狀(僵直,靜坐不能,震顫),遲發性的運動困難。</p>
<p>Hopan 0.5mg 和寧錠 0.5 毫克 衛署藥製字第 037352 號 A037352100</p>		<p>Haloperidol</p>	<p>躁病, 思覺失調症, 噁心,嘔吐,攻擊性與破壞性之行為障礙</p>	<p>成人初始劑量 2-3 次,每次 0.5-2mg。 兒童通常每 3 公斤體重服 0.1mg。</p>	<p>血壓下降,心電圖變化,強度的筋強硬,嚥下困難,發汗,發熱,手指振抖,流口水。</p>
<p>JALINE LOTION 250MG/ML 疥寧洗液 衛署藥製字第 035885 號</p>		<p>Benzyl Benzoate</p>	<p>疥癬,虱感染。</p>	<p>一次劑量 10ml,頭髮洗淨後使用,約 3 分鐘後以水洗淨。</p>	<p>皮膚可能會有輕微刺激反應或者灼熱感,若症狀持續或加重,請告知醫師。</p>
<p>Knowful Film Coated Tablets 1200mg 腦福 膜衣錠 1200 毫克 衛署藥製字第 047679 號 A047679100</p>		<p>Piracetam</p>	<p>1.腦血管障礙及老化所引起的智力障礙可能有效。 2.皮質性陣發性抽搐之輔助療法。</p>	<p>1-2 錠/日。</p>	<p>耳部及內耳:眩暈。 胃腸道:腹痛,上腹痛,腹瀉,噁心,嘔吐。</p>


<p>LAMTA TABLETS 50MG</p> <p>"信東" 癲癇錠 50 毫克</p> <p>衛署藥製字第 047400 號</p> <p>AC47400100</p>		<p>Lamotrigine</p>	<p>癲癇(泛發性強直陣攣性發作及簡單性或複雜性局部發作)12 歲以上之單獨用藥治療；2 歲以上之輔助性治療；LENNOX-GASTAUT SYNDROME 徵候群之治療。</p>	<p>1.單獨治療：初期一天一次 50mg，持續兩週。接著一天二次 50mg，持續兩週。維持劑量 200~400mg/day。</p> <p>2.輔助治療：初期隔天一次 25mg，持續兩週。接著一天一次 25mg，持續兩週。維持劑量 100~200mg/day。</p>	<p>皮膚疹.複視.視力模糊.昏眩.頭痛.疲勞。</p>
<p>Latuda 40mg</p> <p>樂途達錠 40 毫克</p> <p>衛部藥輸字第 026668 號</p> <p>BC26668100</p>		<p>Lurasidone Hydrochloride</p>	<p>思覺失調症</p>	<p>每日一次, 隨餐口服 40~160mg/day</p>	<p>靜坐不能、錐體外症狀、噁心</p>
<p>Latuda 80mg</p> <p>樂途達錠 80 毫克</p> <p>衛部藥輸字第 026667 號</p> <p>BC26667100</p>		<p>Lurasidone Hydrochloride</p>	<p>思覺失調症</p>	<p>每日一次, 隨餐口服 40~160mg/day</p>	<p>靜坐不能、錐體外症狀、噁心</p>


<p>Levozine 5mg 舒敏寧 5 毫克 衛署藥製字第 049833 號 AC49833100</p>		Levocetirizine	過敏	睡前 5mg	嗜睡、口乾
<p>Ligilin Capsules 300mg 鋰齊寧膠囊 300 毫克 衛署藥製字第 09299 號 A009299100</p>		Lithium Carbonate	躁病.預防躁鬱病。	急性治療:每日劑量 900-1800mg。 長期治療:血中鋰濃度應 調至 0.6-1.2mEq/l。	腹脹.嘔吐.倦睡及肌肉 無力.眩暈.運動失調.視 野模糊.耳鳴.多尿。
<p>LODITON TABLETS 500MG 伏糖錠 500 公絲 衛署藥製字第 043706 號 AB437061G0</p>		Metformin	糖尿病。	一天三次，每次一錠。	食慾不振.噁心.嘔吐.下 痢.便秘。
<p>LODOPIN TABLETS 25MG 絡篤平錠 2 5 公絲 衛署藥輸字第 022672 號 B022672100</p>		ZOTEPINE	思覺失調症	成人通常一日 75-150mg，分次口服，但 可依年齡、症狀調整劑 量，一日量可增加至 450mg	嗜睡(5.53%)、失眠 (3.01%)、口渴(2.93%)、 便秘(2.83%)。


<p>LODOPIN TABLET 50MG</p> <p>絡篤平錠50公絲</p> <p>衛署藥輸字第 022673 號</p> <p>B022673100</p>		<p>ZOTEPINE</p>	<p>思覺失調症</p>	<p>成人通常一日 75-150mg，分次口服，但 可依年齡、症狀調整劑 量，一日量可增加至 450mg</p>	<p>嗜睡(5.53%)、失眠 (3.01%)、口渴(2.93%)、 便秘(2.83%)。</p>
<p>Lorazin 1mg</p> <p>樂力靜 1 公絲</p> <p>衛署藥製字第 022816 號</p> <p>AC228161G0</p>		<p>Lorazepam</p>	<p>焦慮狀態。</p>	<p>(1)焦慮：一天 1~6mg， 分 2~3 次服用。最大劑 量：一天 10mg。 (2)失眠又焦慮：1~4mg， 睡前服用。</p>	<p>嗜睡、警覺性、動作協調 能力降低。</p>
<p>Lote 100mg</p> <p>"南光" 樂得腸溶錠 100 公 絲</p> <p>衛署藥製字第 045381 號</p> <p>A045381100</p>		<p>FLUVOXAMINE MALEATE</p>	<p>情緒性症狀(持續性 情緒低落，精神功能 傷害及精神異常等)。</p>	<p>憂鬱症：每日 100~200mg，分次投與。 最高劑量每日 300mg</p>	<p>噁心、嘔吐、下痢、思 睡、頭暈、激動、失眠、 頭痛、震顫</p>
<p>MEDICON-A CAPSULES</p> <p>減咳康複合膠囊</p> <p>衛署藥製字第 021758 號</p> <p>A021758100</p>		<p>Lysozyme Chloride, Dextromet horphan Hbr, Potassium Cresolsulfonate</p>	<p>鎮咳、祛痰。</p>	<p>成人(15 歲以上) 1 次 1 膠 囊，1 日服用 3 次。</p>	<p>胃腸障礙、暈眩、思睡。</p>

<p>Mentax Cream 10mg/1%</p> <p>微可舒乳膏 1%</p> <p>衛署藥製字第 044012 號</p> <p>A044012321</p>		<p>Butenafine HCl</p> <p>10mg(1%)</p>	<p>皮膚真菌屬黴菌引起之皮膚感染症。</p>	<p>香港腳,指間黴菌病1天2次使用一星期。身體,雙手,皮膚皺摺部位之真菌感染1天1次2星期。</p>	<p>發紅,發癢。</p>
<p>MESYREL TABLETS 50MG</p> <p>美舒鬱錠 50 毫克</p> <p>衛署藥製字第 033664 號</p> <p>A033664100</p>		<p>Trazodone</p> <p>Hydrochloride</p>	<p>治療各種型態之抑鬱症。</p>	<p>50-600mg , Usually 100-300mg / day</p>	<p>鎮靜和疲勞,激動,口乾,頭昏和低血壓有時可能會發生。</p>
<p>Mangesium Oxide Tablets</p> <p>氧化鎂錠 250 毫克</p> <p>衛署藥製字第 023521 號</p> <p>A023521100</p>		<p>Magnesium Oxide</p>	<p>軟便。</p>	<p>1-6 Tabs Qid</p>	<p>若有噁心,嘔吐,嚴重腹痛或發疹等過敏症狀時,應停止使用。</p>
<p>Migbose 50mg</p> <p>麥若醣膜衣錠</p> <p>衛署藥製字第 051714 號</p> <p>AC51714100</p>		<p>Miglitol</p>	<p>第二型糖尿病</p>	<p>起始劑量 25mg , 每天 3 次, 隨餐服用。維持劑量為 50mg , 每天 3 次。最大劑量 100mg , 每天 3 次。</p>	<p>腹瀉、脹氣。</p>


<p>MOCALM S.C. TABLET</p> <p>永康緒糖衣錠</p> <p>衛署藥製字第 046759 號</p> <p>A046759100</p>		<p>Melitracen Hcl + ,Flupentixol 2hcl</p>	<p>焦慮症·憂鬱症。</p>	<p>成人:每日 2 粒，早晨和 中午各服 1 粒。</p>	<p>在推薦劑量下，極少發 生副作用，可能會有短 暫性焦躁不安與失眠 現象發生。</p>
<p>Modipanol 1mg</p> <p>美得眠膜衣錠 1 公絲</p> <p>衛署藥製字第 045779 號</p> <p>A045779100</p>		<p>Flunitrazepam</p>	<p>失眠。</p>	<p>成人患者的建議劑量為 0.5-1 mg/day，特殊情況下 可提高劑量至 2 mg。</p>	<p>口乾,便秘,視力模糊,頭 暈,嗜睡。</p>
<p>MOODYTEC S.C. TABLETS 3MG</p> <p>緒得克糖衣錠</p> <p>衛署藥製字第 046706 號</p> <p>AC46706100</p>		<p>Flupentixol</p>	<p>思覺失調症。</p>	<p>精神病、精神分裂症：(1) 安靜病人每日口服 3-15mg(2)中度症狀病人 每日 15-30mg</p>	<p>偶有錐體束外症狀發 生，用抗帕金森氏症藥 即可克服。若繼續服用 本藥，此症狀亦會自然 消失。自主神經方面的 副作用極少發生，有病 人偶有暫時性失眠。</p>
<p>MYCOMB OTIC DROPS</p> <p>美康乳膏</p> <p>衛署藥製字第 021924 號</p> <p>A021924323</p>		<p>Neomycin ,Nystatin,Triamcinol one Acetonide,Gramicidi n</p>	<p>外耳道念珠菌感染。 表面細菌感染,異位 性皮膚炎,濕疹性皮 膚炎,過敏接觸性皮 膚炎,原發刺激性接 觸皮膚炎,皮脂溢出 性皮膚炎,溢出性皮 膚炎,神經性皮膚炎。</p>	<p>每天使用 3-4 次,每次 2-3 滴，滴入耳道，或以棉 球沾之塞於耳道內使用。</p>	<p>痤瘡,油性皮膚,臉部毛 髮增長,掉髮。</p>

<p>NEUROQUEL F.C. TABLETS 25MG 腦樂靜膜衣錠 25 毫克 衛署藥製字第 055041 號 AB55041100</p>		<p>Quetiapine</p>	<p>思覺失調症,雙極性疾患之躁症發作。</p>	<p>成人,精神分裂症:每日劑量範圍通常在 150-750mg 雙極性疾患之躁症發作:一般有效劑量在每日 400-800mg 的範圍之間。</p>	<p>疲倦想睡,失眠,頭暈,頭痛,便秘,部分病人會有姿勢性低血壓,體重增加,口乾。</p>
<p>Nodoff 5mg 納得復膜衣錠 5 公絲 衛署藥製字第 052617 號 A052617100</p>		<p>Olanzapine</p>	<p>思覺失調症及其它明顯有正性及/或負性之思覺失調症,雙極性疾患之躁期發作,預防雙極性疾患之復發。</p>	<p>劑量範圍為每天 5~20mg。 65 歲以上及/或腎肝功能不全之病患:起始劑量 5mg/day。</p>	<p>頭暈,食慾增加,坐立不安,口乾,便秘,手發抖或顫抖。</p>
<p>NORM-SALINE INJECTION 諾沙林注射液 衛署藥製字第 010654 號 A010654277</p>		<p>Sodium Chloride</p>	<p>手術或其他疾患之水分及電解質的補給。</p>	<p>成人 1 回 500-1500ml 由皮下或靜脈,緩慢地點滴注射。</p>	<p>坊單未註記。</p>
<p>Onsleep Capsules 10mg “Standard” “生達”入眠順膠囊 10 毫克 衛署藥製字第 049166 號 AC49166100</p>		<p>Zaleplon</p>	<p>治療難以入睡之失眠病人,僅適用於嚴重,病人功能障礙或遭受極度壓力之失眠症患者。</p>	<p>成人建議劑量 10 毫克。</p>	<p>頭痛,背痛,困倦。</p>

<p>Paramol 500mg 普除痛錠 500 公絲 衛署藥製字第 020444 號 A020444100</p>		<p>Acetaminophen</p>	<p>解熱,鎮痛(頭痛,牙痛,咽喉痛,關節痛,神經痛,肌肉痛,月經痛)。</p>	<p>成人：每次 1-2 錠，每天三或四次。</p>	<p>若有發疹、嘔吐、食慾不振、耳鳴等症狀時，應停藥並就醫。</p>
<p>pms-MIRTAZAPINE Tablets 30mg 緩憂錠 30 毫克 衛署藥輸字第 024530 號 BC24530100</p>		<p>MIRTAZAPINE</p>	<p>鬱症</p>	<p>起始劑量為每日 15 毫克。常用的藥效日劑量為 15~45 毫克。睡前服藥一次。也可早上服藥一次，晚上服藥一次。</p>	<p>食慾增加、噁心、嗜睡、暈眩、頭痛、水腫、體重增加。</p>
<p>PRIMPERAN FILM COATED TABLETS 腹寧朗膜衣錠 衛署藥製字第 022987 號 A0229871G0</p>		<p>Metoclopramide</p>	<p>預防嘔吐,逆流性消化性食道炎,糖尿病引起之胃腸蠕動異常。</p>	<p>成人 1 日 2-3 錠，分 2-3 次於飯前服用，但可依年齡,症狀適宜增減之。</p>	<p>腹瀉,月經週期改變,乳汁分泌增加,噁心。</p>
<p>Propranolol 10mg 心律錠 10 毫克 衛署藥製字第 009102 號 AC09102100</p>		<p>Propranolol</p>	<p>狹心症,不整律(上心室性不整律,心室性心搏過速),原發性及腎性高血壓,偏頭痛。</p>	<p>心律不整：10-30mg 一天 3-4 次，飯前及睡前服用。</p>	<p>呼吸困難,手腳冰冷,心情鬱卒,心跳減慢,性功能障礙。</p>



<p>PROZAC 20MG DISPERSIBLE 百憂解錠 20 公絲 衛署藥輸字第 022064 號 B022064100</p>		<p>Fluoxetine</p>	<p>抑鬱症.暴食症.強迫症。</p>	<p>憂鬱症：每天早上服用 20mg，一天最高劑量為 80mg，若每日劑量大於 20mg，應分成 2 次投予。 神經性貪食症：一天 60mg。 強迫症：初期一天 20mg，最高一天 60mg。</p>	<p>性功能障礙.靜坐不能.皮膚紅疹.蕁麻疹或癢。</p>
<p>Quetia 200mg “五洲”潰停亞錠 200 毫克 衛署藥製字第 055245 號 A055245100</p>		<p>Quetiapine</p>	<p>思覺失調症.雙極性疾患之躁症發作。</p>	<p>成人,精神分裂症:每日劑量範圍通常在 150-750mg 間。雙極性疾患之躁症發作:一般有效劑量在每日 400-800mg 的範圍之間。</p>	<p>疲倦想睡.失眠.頭暈.頭痛.便秘.部分病人會有姿勢性低血壓.體重增加.口乾。</p>
<p>Ripam 2mg Tablet 利平靜 2 毫克 衛署藥製字第 058017 號 AC580171G0</p>		<p>Clonazepam</p>	<p>癲癇</p>	<p>成人:起始劑量 0.5mg，每天 3 次，每 3 次增加 0.5-1.0mg，每天最大劑量為 20mg。 小孩一起始劑量每天每公斤 0.01-0.03mg，每 3 天增加 0.25-0.5mg，一般的劑量範圍(0.1-0.2mg/kg/天)。</p>	<p>疲倦.昏昏欲睡.肌張力過低.肌肉無力.頭昏.頭暈.運動失調。</p>
<p>RISPERIDONE F.C. TABLETS 2MG 瑞波膜衣錠 2 毫克 衛署藥製字第 057275 號 AB57275100</p>		<p>Risperidone</p>	<p>思覺失調症之相關症狀,雙極性疾患之躁症發作。治療失智症病人具嚴重攻擊性,或思覺失調症類似症狀。</p>	<p>第 1 天 1mg，1 天 2 次； 第 2 天 2mg，1 天 2 次； 第 3 天 3mg，1 天 2 次； 維持劑量 2-4mg，一天 2 次，最大劑量 8mg，一天 2 次。</p>	<p>動作遲緩.坐立不安.視力模糊.月經週期改變.手發抖。</p>

<p>RISPERDAL ORAL SOLUTION 1MG/ML 理思必妥內服液劑 1 公絲 衛署藥輸字第 022094 號 B022094143</p>		<p>RISPERIDONE</p>	<p>思覺失調症之相關症狀，雙極性疾患之躁症發作。治療失智症病人具嚴重攻擊性，或思覺失調症類似症狀。</p>	<p>Initial 1ml bid,increases in increments of 1ml bid on the second and third day , target dose of 3ml bid . usual range:4-8 mg/day.</p>	<p>動作遲緩.坐立不安.視力模糊.月經週期改變.手發抖</p>
<p>RIVOTRIL 0.5MG TABLET 利福全 0.5 毫克 衛署藥輸字第 003077 號 BC03077100</p>		<p>Clonazepam</p>	<p>癲癇</p>	<p>成人:起始劑量 0.5mg，每天 3 次，每 3 次增加 0.5-1.0mg，每天最大劑量為 20mg。小孩一起始劑量每天每公斤 0.01-0.03mg，每 3 天增加 0.25-0.5mg，一般的劑量範圍(0.1-0.2mg/kg/天)。</p>	<p>疲倦.昏昏欲睡.肌張力過低.肌肉無力.頭昏.頭暈.運動失調。</p>
<p>ROLIKAN INJECTION 樂麗康注射液 衛署藥製字第 027456 號 AC27456238</p>		<p>Sodium Bicarbonate</p>	<p>酸中毒。</p>	<p>普通依症狀程度，每日或隔日注射一次靜脈，每次 20~60ml。</p>	<p>口唇麻木感.知覺異常.脈搏減慢.噁心。</p>

<p>ROSUP CAPSULES 25MG 瑞平膠囊 25 毫克 衛署藥製字第 039769 號 A039769100</p>		<p>Loxapine Succinate</p>	<p>思覺失調症。</p>	<p>每天 50-100mg，最大劑量 250mg。</p>	<p>輕度昏沈感.錐體外反應.遲發性運動困難.抗膽鹼作用。</p>
<p>SENNAPUR TABLETS 清立飄糖衣錠 衛署藥製字第 043488 號 A043488100</p>		<p>Sennoside</p>	<p>緩解便秘。</p>	<p>每天 1 次，每次 2 粒。</p>	<p>長期使用會造成電解質不平衡與水分缺乏。</p>
<p>Seroquel XR TM 300 mg Extended-Release Tablets 思樂康持續性藥效錠 300 毫克 衛署藥輸字第 024886 號 B024886100</p>		<p>Quetiapine Fumarate</p>	<p>思覺失調症.雙極性疾患之躁症發作。</p>	<p>成人,精神分裂症:每日劑量範圍通常在 150-750mg 間。雙極性疾患之躁症發作:一般有效劑量在每日 400-800mg 的範圍之間。</p>	<p>疲倦想睡.失眠.頭暈.頭痛.便秘.部分病人會有姿勢性低血壓.體重增加.口乾。</p>
<p>SINPHARDERM CREAM 杏化乳膏 衛署藥製字第 020892 號 A020892343</p>		<p>Urea</p>	<p>去角質(乾燥型主婦濕疹).足蹠部皮裂性皮膚炎.手掌.足蹠角化症.毛孔性苔癬。</p>	<p>1 天 1~2 次塗於患部</p>	<p>局部灼熱感.疼痛感.潮紅.搔癢。</p>

<p>Solacon 200mg 舒可樂錠 200 毫克 衛署藥製字第 025402 號 AC25402100</p>		<p>CHLORZOXAZON E</p>	<p>腰背痛症、頸肩腕症候群、肩關節周圍炎、筋炎、腱炎、脊椎炎、神經痛</p>	<p>1 天 3~4 次、1 次 1 粒</p>	<p>頭暈、嗜睡</p>
<p>STILNOX 10MG FILM-COATED SCORED TABLETS 使蒂諾斯 10 公絲膜衣錠 衛署藥輸字第 021531 號 B021531100</p>		<p>Zolpidem Tartrate</p>	<p>失眠症。</p>	<p>65 歲以下成人；睡前 1 錠。 65 歲以上成人；初劑量以 1/2 錠睡前給藥。</p>	<p>腳步笨拙或不穩。意識混淆。心情鬱卒。</p>
<p>SWITANE TABLET 2MG 瑞丹錠 2 公絲 衛署藥製字第 039597 號 A0395971G0</p>		<p>Trihexyphenidyl Hcl</p>	<p>帕金森氏症候群。</p>	<p>一天 1-2 次/2-15mg。</p>	<p>便秘。流汗減少。排尿疼痛。昏昏欲睡。口乾。畏光。嘔吐。</p>
<p>TOFRANIL TABLETS 10MG 妥富腦糖衣錠 10 公絲 衛署藥輸字第 012880 號 B012880100</p>		<p>Imipramine Hcl</p>	<p>憂鬱病。夜尿。</p>	<p>1.憂鬱症：初始劑量 1 天 30-70mg，分次投于，最大劑量 1 天 300mg。 2.夜尿：學童 1 天 30~50mg，分 1-2 次投于</p>	<p>頭暈。昏昏欲睡。口乾。噁心。</p>

<p>TRANCOLON F.C. TABLETS 7.5MG 特良高朗膜衣錠 7.5 公絲 衛署藥製字第 000844 號 A000844100</p>		<p>Mepenzolate Bromide</p>	<p>激躁大腸症候群。</p>	<p>每日三次,配合三餐使用。</p>	<p>便秘,流汗減少,口鼻喉嚨或皮膚乾燥。</p>
<p>TRYNOL S.C. TABLETS 10MG 德利能糖衣錠 10 公絲 衛署藥製字第 000649 號 AC00649100</p>		<p>Amitriptyline Hcl</p>	<p>憂鬱病。</p>	<p>通常成人每次 25mg,一日服用 2~3 次。</p>	<p>頭暈,昏昏欲睡,口乾,噁心。</p>
<p>Ubixa F.C. Tablets 10mg 憂散膜衣錠 10 毫克 衛署藥製字第 057409 號 AA57409100</p>		<p>Olanzapine</p>	<p>思覺失調症及其它明顯有正性及/或負性之思覺失調症,雙極性疾患之躁期發作,預防雙極性疾患之復發。</p>	<p>起始劑量每天一次,每次 10mg。劑量範圍為每天 5~20mg。65 歲以上及/或腎肝功能不全之病患:起始劑量 5mg/day。</p>	<p>頭暈,食慾增加,坐立不安,口乾,便秘,手發抖或顫抖。</p>
<p>ULEX LOTION 10%(CROTAMITON) "杏輝"悠力素劑液 10%(丁烯醯苯胺) 衛署藥製字第 028952 號 A028952343</p>		<p>Crotamiton</p>	<p>溼疹,神經性皮膚炎,蕁麻疹,蚊蟲咬螫,皮膚搔癢症,疥瘡及其他奇生性皮膚感染。</p>	<p>每日數回患處塗敷或塗擦。搔癢:本劑須擦於感染部位,一天數次直到搔癢減退。</p>	<p>皮膚刺激,紅腫。</p>

<p>Undiarrhea 2mg 安痢膠囊 衛署藥製字第 018620 號 AC18620100</p>		Loperamide	下痢。	起始劑量 4mg，之後每次腹瀉後 2mg，最多 16mg/day，若兩天後仍無法改善，宜停用。	腹痛、噁心、思睡。
<p>Valosine SR 75mg 煩清持續性藥效膠囊 75 公絲 衛署藥製字第 047644 號 AC47644100</p>		Venlafaxine	憂鬱症。	起始劑量為一天 75mg，分二至三次服用。依臨床需要，每日劑量可增加至 150mg，須注意劑量超過 75mg/day 時，調整時間不得低於四天。最高劑量可增加至每天 375mg。可和食物一起吞服。	性功能障礙、高血壓。
<p>VALSARTAN FILM COATED TABLETS 160MG 舒心樂膜衣錠 160 毫克 衛署藥製字第 055557 號 AB55557100</p>		VALSARTAN	高血壓、心衰竭 (NYHA 二到四級)。心肌梗塞後左心室功能異常。	高血壓：80-160mg，每日一次。最大劑量每日 320mg 為限。	嗜中性白血球減少、頭昏、低血壓。
<p>Vitagen Inj. 50% 美達研注射液 50% 內衛藥製字第 006067 號 N006067238</p>		Glucose	營養補給。	大腿皮下注射。 緩慢靜脈注射。	注射後可能誘發輕度寒顫及發燒。

<p>VOREN 50MG 排裝 非炎腸溶微粒膠囊 50 公絲(待克菲那) 衛署藥製字第 033699 號 A0336991G0</p>		<p>Diclofenac Sodium</p>	<p>緩解發炎及因發炎反應所引起之疼痛。</p>	<p>1-2 次/天。</p>	<p>皮膚紅疹。</p>
<p>Winiful 20mg 胃您好膜衣錠 20 毫克 衛署藥製字第 043501 號 AC435011G0</p>		<p>Famotidine</p>	<p>胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、消化性潰瘍、急性潰瘍、逆流性食道炎。</p>	<p>通常成人 1 次 Famotidine 20mg，1 日 2 次（早餐後、晚餐後或睡覺前經口投與。或者 1 次 40mg，1 日 1 次（睡覺前）經口投與亦可</p>	<p>偶有便秘，腹瀉</p>
<p>WINSUMIN S.C. TABLETS 50MG 穩舒眠糖衣錠 50 公絲 衛署藥製字第 025191 號 A025191100</p>		<p>Chlorpromazine Hcl</p>	<p>躁病. 思覺失調症. 噁心. 嘔吐. 攻擊性與破壞性之行為障礙。</p>	<p>成人每次 25~100mg，一天 1~3 次服用。</p>	<p>面無表情. 坐立不安. 手發抖. 動作遲緩. 頭暈. 低血壓。</p>
<p>XANAX TABLETS 0.25MG 贊安諾錠 0.25 公絲 衛署藥輸字第 021234 號 B0212341G0</p>		<p>Alprazolam</p>	<p>焦慮狀態。</p>	<p>5 ~ 10mg SC, Max 30mg/day。</p>	<p>腳步笨拙或不穩. 頭暈. 昏昏欲睡. 口齒不清. 食慾改變。</p>

<p>Xylmol Oint. 喜癒痔 衛署藥製字第 021455 號 A021455335</p>	 <p>Xylmol Oint.</p>	<p>Zinc Oxide、 Lidocaine、 Aluminum Acetate、 Hydrocortisone Aceta</p>	<p>痔瘡、肛門搔癢、直腸炎、肛門周圍膿腫及脫肛、肛門裂傷</p>	<p>先把手及肛門部位洗淨並擦乾。將少量乳膏或軟膏輕輕按摩塗抹於肛門周圍。早晚及排便後塗於患處。</p>	<p>蠶豆症請勿使用。</p>
<p>YOU-JET F.C. TABLETS 50MG 憂解膜衣錠 50 毫克 衛署藥製字第 044374 號 AB44374100</p>		<p>Sertraline Hydrochloride</p>	<p>鬱症.強迫症.恐慌症.創傷後壓力症候群.社交恐懼症。</p>	<p>Major depression & Obsessive-compulsive disorder: Initially, 50mg qd; max. 200mg/day. Panic disorder: Initially, 25mg qd; max. 200mg/day。</p>	<p>性功能障礙。</p>
<p>ZOLON FILM COATED TABLETS 7.5MG "信東" 樂比克膜衣錠 7.5 公絲 衛署藥製字第 046013 號 A046013100</p>	 <p>Zolon 7.5mg</p>	<p>Zopiclone</p>	<p>失眠症。</p>	<p>睡前 7.5mg，若嚴重可逐漸增加到 15mg。</p>	<p>嗜睡.眩暈.苦味味覺。</p>
<p>ZYPREXA ZYDIS 10MG 津普速 口溶錠 10 公絲 衛署藥輸字第 023912 號 B023912100</p>	 <p>Zyprexa Zydis 10mg</p>	<p>Olanzapine Micronized</p>	<p>思覺失調症及其它明顯有正性及/或負性之思覺失調症，雙極性疾患之躁期發作，預防雙極性疾患之復發。</p>	<p>起始劑量每天一次，每次 10mg。劑量範圍為每天 5~20mg。65 歲以上及/或腎肝功能不全之病患：起始劑量 5mg/day。</p>	<p>頭暈.食慾增加.坐立不安.口乾.便秘.手發抖或顫抖。</p>

<p>Zyprexa Zydis 5mg</p> <p>津普速 口溶錠 5 公絲</p> <p>衛署藥輸字第 023913 號</p> <p>B023913100</p>		<p>Olanzapine</p> <p>Micronized</p>	<p>思覺失調症及其它 明顯有正性及/或負 性之思覺失調症，雙 極性疾患之躁期發 作，預防雙極性疾患 之復發。</p>	<p>起始劑量每天一次，每次 10mg。劑量範圍為每天 5~20mg。 65 歲以上及/或 腎肝功能不全之病患：起 始劑量 5mg/day。</p>	<p>頭暈.食慾增加.坐立不 安.口乾.便秘.手發抖或 顫抖。</p>
--	--	-------------------------------------	---	--	---